

## Corniolo

**Famiglia :**  
**Cornaceae**

### **CORNUS MAS L.**

- Foglie :** decidue, semplici a lamina ovale-ellittica, di colore grigio verde acuminate, di 4-10 cm con 3-5 paia di nervature sub-parallele al margine , inserzione opposta
- Fiori :** piccoli fiori gialli riuniti in infiorescenze formate da una decina di singoli fiori, **quattro brattee alla base**; la fioritura avviene tra gennaio e marzo quando ancora mancano le foglie
- Frutti :** drupe ovoidali, pendule, di colore rossastro alla maturazione

**Portamento:** arbustivo-cespuglioso, ma a volte si presenta anche come alberello

Pianta spontanea in quasi tutta l' Italia nei boschi radi di querce e nei boschi misti di latifoglie, al margine del bosco e negli arbusteti in ambienti caldi e aridi d'estate molto simile alla sanguinella. Cresce su suoli mediamente profondi, ricchi di basi e di sali nutritizi. Il suffisso latino mas=maschile sembra riferirsi al legno particolarmente duro (i greci ne ricavavano le aste per le lance) e si contrapporrebbe al sanguinello, denominato dal Plinio Cornus "femina" a legno fragile. A scopo ornamentale sono state selezionate numerose varietà (C. alba C. canadensis C. controversa C. kousa C. officinalis C. racemosa C. sericea C. elegantissima C. aurea)

