

Carpino Nero

OSTRYA CARPINIFOLIA Scop.

**Famiglia :
Corylaceae**

Foglie : decidue, ovali acuminate, a margine doppiamente dentato, inserzione alterna

Fiori : unisessuali, in amenti quelli maschili, in spighe quelli femminili, fioritura: apr/mag

Frutti : acheni chiusi in brattee pendenti

Portamento: alt.: sino a 20 m

Il *Carpino nero*, in Italia, è particolarmente diffuso nelle regioni nord-orientali e adriatiche. Si trova associato in particolar modo con la Roverella nel formare boschi xerofiti e termofili. Predilige infatti terreni drenanti, ricchi di calcare, adattandosi anche a quelli poco profondi in quanto ha un apparato radicale piuttosto superficiale. In inontagna si sviluppa sui versanti più riparati ed esposti al sole poiché si tratta di una specie eliofila e termofila, che teme le gelate. Il *Carpino nero* è, stato, negli ultimi anni, rivalutito anche come essenza di interesse paesaggistico, date anche le sue scarse esigenze di substrato; viene usato per formare siepi e alberature stradali (sfruttando la sua capacità pollonifera). Il legno è più rossastro rispetto a quello del *Carpino bianco* e trova la stessa applicazione.

